

۵۰۰ سؤال تخصصی روانپزشکی

مجموعه کامل سؤالات تخصصی بورد، پرهبورد و امتحانات داخلی

دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

۵۰۰ سؤال تخصصی روانپزشکی

مجموعه کامل سؤالات تخصصی بورد، پرهبود و امتحانات داخلی
دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

تألیف

دکتر ماهیار آذر

روانپزشک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سیما نوحی

روانپزشک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله





کتاب ارجمند

<p>سیر شناسه: آذر، ماهیار، ۱۳۳۴.-</p> <p>عنوان و نام پدیدآور: ۵۰۰۰ سؤال تخصصی روانپژشکی</p> <p>تخصصی روانپژشکی، بورد، پرهبورد و امتحانات داخلی داشگاههای علوم پزشکی ایران / گردآوری: ماهیار آذر، سیمانوی.</p> <p>مشخصات نشر: تهران: کتاب ارجمند، ۱۳۹۱.</p> <p>مشخصات ظاهری: ۷۲۸ ص، قطع: وزیری</p> <p>شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۰۸-۲</p> <p>وضعیت فهرستنوسی: فیبا</p> <p>موضوع: دانشگاهها و مدارس عالی -- ایران -- آزمونها، روانپژشکی -- آزمونها و تمرینها (عالی)</p> <p>شناسه افزوده: نوحی، سیما، ۱۳۴۷</p> <p>ردبهندی کنگره: ۱۳۹۱ LB۲۳۵۳/۲۱۱۵ ب۹</p> <p>ردبهندی دیوبی: ۳۷۸/۱۶۶۴</p> <p>شماره کتابشناسی ملی: ۲۸۶۶۲۰۱</p>	<p>دکتر ماهیار آذر، دکتر سیما نوحی فروست: ۳۸۶</p> <p>ناشر: انتشارات کتاب ارجمند</p> <p>حروفچین و صفحه آرا: مرادیان</p> <p>طراح جلد: احسان ارجمند</p> <p>چاپ: سامان، صحافی: نوین</p> <p>چاپ اول، دی ماه ۱۳۹۱، ۱۱۰ نسخه</p> <p>شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۰۸-۲</p> <p>www.arjmandpub.com</p> <p>این اثر، مشمول قانون حمایت از مؤلفان و مصنفات و هنرمندان ایران است، هر کس تمام یا مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موکز پخش: انتشارات ارجمند

- دفتر مرکزی: تهران بلوار کشاورز، بین کارگر و آذر، پلاک ۲۹۲، تلفن ۸۸۹۸۲۰۴۰
- شعبه اصفهان: دروازه شیراز، خ. چهارباغ بالا، پاساز هزارجریب تلفن ۰۳۱۱-۶۲۸۱۵۷۴
- شعبه مشهد: احمدآباد، پاساز امیر، انتشارات مجده داش تلفن: ۰۵۱-۸۴۴۱۰۱۶
- شعبه بابل: خیابان گنج افروز، پاساز گنج افروز تلفن ۰۱۱-۲۲۲۷۷۶۴
- شعبه رشت: خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه عضدی تلفن ۰۱۳۱-۳۲۳۲۸۷۶
- شعبه ساری: بیمارستان امام، روبروی ریاست تلفن: ۰۹۱۱۸۰۲۰۰۹۰

بهای ۲۹۰۰۰ تومان

فهرست

٩	فصل ۱: سایکوزها
٦٣	پاسخنامه
٦٧	فصل ۲: اختلالات خلقی
١٢٥	پاسخنامه
١٣١	فصل ۳: اختلالات اضطرابی
٢٠٥	پاسخنامه
٢١٣	فصل ۴: اختلالات جنسی، خواب و خوردن
٢٥١	پاسخنامه
٢٥٥	فصل ۵: کودک و نوجوان
٣٢٥	پاسخنامه
٣٣١	فصل ۶: روان‌شناسی
٣٨٧	پاسخنامه
٣٩٣	فصل ۷: اعتیاد، مواد مخدر و محرک
٤٢٩	پاسخنامه
٤٤٣	فصل ۸: علایم شناسی
٤٨٥	پاسخنامه
٤٨٩	فصل ۹: اختلالات شخصیت
٥٠٧	پاسخنامه

۵۰۹	فصل ۱۰: دمانس و دلیریوم
۵۳۱	پاسخنامه
۵۳۳	فصل ۱۱: داروهای روان‌پزشکی و شوک‌درمانی
۶۶۵	پاسخنامه
۶۷۷	فصل ۱۲: مغز و رفتار
۷۲۵	پاسخنامه

مقدمه

سال هاست که رقابت‌های سنگین امتحانات بردهای تخصصی و ارتقاء داخلی بخش‌های روانپزشکی با افزایش سال‌های تحصیلی دستیاری و تعداد دستیاران، شدت یافته و این گروه از پزشکان با پویایی ویژه‌ای در تلاش برای موفقیت در این نبرد علمی آموزشی‌اند و هر چند سال یکبار کوشش می‌گردد جهت یاری و آسان‌سازی دستیابی به سوالات بردهای تخصصی و امتحانات درون‌دانشگاهی شهرهای مختلف کشور به جمع آوری این سوالات پرداخته و در حین تقسیم‌بندی آنها در گروه‌های خاص و مربوط به هر یک از فصول اساسی کتاب‌های مرجع روانپزشکی، کوششی به عمل آمده تا بلکه سرعت عمل دستیاران را در زمان‌های کوتاه و پُر استرس برای امتحانات بردهای تخصصی بیشتر نماییم. این مجموعه نیز حدود پنج هزار سؤال روانپزشکی جمع آوری شده و طراحی شده دانشگاهی است که با کوشش همکاران دستیار در ۱۲ فصل جداگانه گنجانده شده و سعی در جواب‌یابی صحیح نیز گردیده که علی‌رغم مشکلاتی که همیشه در جواب سوالات تستی به صورت عدم جواب یکسان در کتاب‌های مراجع مختلف و یا عدم یکسان بودن نظریات استاد طراح سؤال در مفاهیم، تا آنجا که امکان داشته، جواب‌ها بررسی و اعلام گردیده که گاه ممکن است نادرست و یا بدون جواب و نیز حتی دوجوابه و یا تکراری بوده که با همت استاد و دستیارانی که این سوالات را مطالعه می‌نمایند و نظریات خود را در آینده اعلام خواهند نمود، به تصمیح آن خواهیم پرداخت و گاه نیز سوالات مربوط به ژورنال‌های روانپزشکی به علت قدمت و تاریخ گذشتگی آن جهت پیدا نمودن جواب در دسترس نبودند که امیدواریم این اشکالات را در حجم بزرگ، بر ما بینشایید.

از همکاران گرامی: دکتر علی مهریان، دکتر یاسر موسوی ندوشن، دکتر رضا عسگری رابری؛ دستیاران ارشد روانپزشکی دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی که در تنظیم و ارزیابی این مجموعه ما را همکاری نمودند و همچنین از جانب دکتر محسن ارجمند، یکی از نقاط امید روانپزشکان و روان‌شناسان کشور، که همیشه مساعدت‌های ایشان رهنمود علمی ما بوده است سپاسگزاریم.

مؤلفین

بهار ۱۳۹۱ - تهران

فصل اول

سایکوزها

اسکیزوفرن، اسکیزوافلتیو، هذیان‌ها، سایکوز‌های
بعد از هاملتی، سایکوزگذر، سایکوز مشترک و...

فصل ۱

سایکوزها

۱- کدام یک از درمان‌های زیر بر اساس مروور Bustillo et al (2001) منجر به پیش‌گیری از عود در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی می‌شود؟

- (الف) درمان شناختی رفتاری
(ب) آموزش مهارت‌های اجتماعی
(ج) خانواده‌درمانی
(د) حمایت در کاریابی

۲- بیماری که در هشیاری کامل بسر می‌برده، یکباره متوجه و متقدعد شده که نام او به عنوان یک هنرمند محبوب بر سر زبان‌ها افتداده است. با این توصیف کدام علامت درست است؟

- (الف) Delusional Percept
(ب) Delusional Mood
(ج) Nonsystematized Delusion
(د) Autochthonous Delusion

۳- در درمان سایکوز پس از زایمان، کدام مورد صحیح است؟
(الف) به مادر شیرده می‌توان هالوپریدول تجویز نمود.

- (ب) مادرانی که در بارهٔ صدمه رساندن به نوزاد اشتغال ذهنی دارند، نباید با نوزاد تماس داشته باشند.
(ج) روان‌درمانی خصوصاً در اوایل دوره درمان کارسازتر می‌باشد.
(د) داروهای ضدافسردگی و لیتیوم در درمان آن مؤثر می‌باشند.

۴- کدام یک از نسبت‌های فامیلی زیر در اختلال سایکوتیک مشترک، شیوع کمتری دارد؟
(الف) خواهر - خواهر
(ب) برادر - برادر
(ج) مادر - کودک
(د) شوهر - زن

۵- کدام یک از ویژگی‌های پارافرنسیا است؟
(الف) شروع در سن جوانی
(ب) هذیان‌های جسمانی
(ج) ارتباط با دمانس
(د) رابطهٔ ژنتیک با اسکیزوفرنی

۶- در کدام یک از موارد زیر بروز علایم کاتاتونی شایع‌تر گزارش شده است؟
(الف) اسکیزوفرنی
(ب) اختلال دوقطبی I
(ج) اختلالات عضوی مغزی
(د) افسردگی اساسی

۷- تأثیر صدمه مغزی ناشی از تروما (Traumatic Brain Injury) بر افزایش ریسک ابتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با گروه کنترل به چه میزانی گزارش شده است؟

- (الف) یک تا دو برابر
- (ب) دو تا چهار برابر
- (ج) سه تا ده برابر
- (د) تفاوتی نداشته است.

۸- کدام یک از داروهای ذیل بیشتر در ایجاد علایم مشابه اسکیزوفرنی تأثیر داردند؟

- (الف) توپیرامات
- (ب) کاربامازپین
- (ج) لاموتبریزین
- (د) سدیم والپروات

۹- مفهوم خانواده‌های شبه دوسویه (Pseudohostile) و شبه متخاصم (Pseudomutual) در اسکیزوفرنی توسط کدام یک از دانشمندان ذیل توصیف شد؟

- (الف) لیمن وین
- (ب) تئودورلیدز
- (ج) گریگوری بیتسون
- (د) پاول فدرن

۱۰- گزینه نادرست در مرد اسکیزوفرنی با شروع دیررس کدام است؟

- (الف) پس از ۴۵ سالگی شروع می‌شود.
- (ب) پیش‌آگهی آن مطلوب است.
- (ج) این اختلال در زنان شایع‌تر است.
- (د) باز نبودن علایم پارانوئیداز مشخصات آن است.

۱۱- چه میزان از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در سیر طولی اختلال، زندگی نسبتاً نرم‌الی را سپری خواهند کرد؟

- (الف)٪ ۱۰-۲۰
- (ب)٪ ۲۰-۳۰
- (ج)٪ ۳۰-۴۰
- (د) کمتر از٪ ۱۰

۱۲- در یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی کدام‌یک از گزینه‌های زیر معروف فقدان مرزهای ایگو (Loss of ego boundaries) نمی‌باشد؟

- (الف) هویت کیهانی (Cosmic Identity)
- (ب) عقاید انتساب (ideas of reference)
- (ج) نولوژیسم (neologism)
- (د) ایجاد شک در جنسیت خویش (doubt in their sexuality)

۱۳- در مورد نقش گلوتامات در اسکیزوفرنی گزینه نادرست کدام است؟

- (الف) این نظریه تنها توجیهی بر علایم منفی در اسکیزوفرنی است.
- (ب) براساس فهم ما از نقش NMDA در تنظیم رفتار و شناخت شکل گرفته است.
- (ج) تأکید بر کاهش فعالیت سیستم گلوتامات در اسکیزوفرنی است.
- (د) فعالیت گیرنده‌های دوپامینی باعث مهار نورون‌های گلوتاماترژیک می‌شود.

۱۴- در مورد اختلال اسکیزوفرنی فرم کدام عبارت نادرست است؟

- (الف) معمولاً بیماران نیازمند بستری می‌شوند.
- (ب) نیاز به ۳-۶ ماه مصرف آنتی سایکوتیک دارند.
- (ج) پاسخ به درمان این بیماران کندتر از اسکیزوفرنیک‌هاست.
- (د) درصورتی که عودکننده باشد از لیتیوم نیز می‌توان استفاده کرد.

۱۵- تعریف کدام‌یک از موارد زیر است؟ Schizotaxia

- (الف) استعداد ژنتیکی ابتلا به اسکیزوفرنی
- (ب) اختلال شخصیت خوش‌A
- (ج) اسکیزوفرنی ثانوی به بیماری طبی
- (د) اسکیزوفرنی با شروع دیررس

۱۶ - در درمان اختلال اسکیزوافکتیو، نوع افسرده کدام یک از داروهای زیر بیشتر توصیه شده است؟

- (الف) لیتیوم
- (ب) کاربامازپین
- (ج) فلوكرتین
- (د) تری‌میپرامین

۱۷ - (اتوسکوبی) جزء کدام یک از موارد تشخیصی زیرا است؟

- (الف) اختلالات روان‌پریشی حاد و کدرا
- (ب) اختلال هذیانی
- (ج) اختلال روان‌پریشی مشترک
- (د) اختلال روان‌پریشی نامعین

۱۸ - کدام مورد جهت افتراق اسکیزوفرنیا از سایکوز اسکیزوفرنیا ابی‌لپسی صحیح است؟

- (الف) اضیحال شخصیتی بیشتر در اسکیزوفرنیا
- (ب) گرایشات مذهبی بیشتر در اسکیزوفرنیا
- (ج) ایجاد عالیم منفی کمتر در اسکیزوفرنیا
- (د) احتمال کمتر وجود هذیان‌های سیستماتیزه در اسکیزوفرنیا

۱۹ - براساس اطلاعات محدودی که وجود دارد، پیش‌آگهی کدام یک از انواع اختلالات هذیانی نامناسب‌تر است؟

- (الف) Persecutory d.
- (ب) Somatic d.
- (ج) grandiose d.
- (د) erotic d.

۲۰ - در مورد علل طبی اختلالات هذیانی کدام مورد نادرست است؟

- (الف) هذیان‌های کمپلکس غالباً در اثر سایکوپاتولوژی‌های ساب کورتیکال رخ می‌دهند.
- (ب) anosognosia در انفارکت‌های نیم‌کره راست شایع هستند.
- (ج) سندرم Capgrass می‌تواند در کمبود B_{12} Vit دهد.
- (د) Reduplicative Paraamnesia در انفارکت‌های نیم‌کره چپ شایع هستند.

۲۱ - کدام یک از عوامل خطرساز زیر در بروز اسکیزوفرنیا کمترین نقش دارد؟

- (الف) سوء‌صرف کاناییس
- (ب) وابستگی به برخی گروه مهاجرین
- (ج) رویدادهای زندگی
- (د) تولد در زمستان

۲۲ - کدام یک از عوامل زیر در بروز دیرهنگام اسکیزوفرنیا نقش دارد؟

- (الف) جنسیت مرد
- (ب) پیشینه خانوادگی روان‌پریشی
- (ج) پیشینه خانوادگی اختلال خلقی
- (د) ناهنجاری‌های مختصر جسمی

۲۳ - در بررسی ژنتیکی اسکیزوفرنیا مनظور از Phenocopies کدام یک از بیانات زیر است؟

- (الف) نشانگان شبه اسکیزوفرنیا در شرایط دیگری نیز می‌تواند ایجاد شود.
- (ب) عوامل خطرساز می‌تواند سبب افزایش بروز اسکیزوفرنیا شود.

(ج) در اختلال اسکیزوفرنیا محدوده‌های تشخیصی وضوح کمتری دارد.

- (د) ژن‌های سبب‌ساز اسکیزوفرنیا در شرایط Reduced Penetrance هستند.

۲۴ - مهم‌ترین عامل برای بروز روان‌پریشی پس از زایمان کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) پیشینه اختلال روان‌پزشکی در فرد یا خانواده
- (ب) پیشینه روان‌پریشی در زایمان پیشین
- (ج) زایمان با عمل سزارین
- (د) تولد نوزاد دختر

۲۵- در رابطه نشانگان بالینی و اختلال شناختی اسکیزوفرنیا کدام یک از بیانات زیر درست نیست؟

- الف) بیشتر بیماران پیش از بروز نشانگان بالینی اختلال شناختی دارند.

ب) بیشتر بستگان درجه یک بیماران علی‌رغم نداشتن روان‌پریشی اختلالات شناختی نشان می‌دهند.

ج) سطح اختلالات شناختی در دوره بهبودی در همان سطح دوره شدت بیماری است.

د) داروهای ضدپسکوز در بهبودی اختلالات شناختی و نشانگان بالینی اثری یکسان دارند.

۲۶- کدام یک از سندرم‌های وابسته به فرهنگ با اختلال روان پریشی کوتاه‌مدت انطباق دارد؟

- Brain Fag (ب) الف) Boufee Delirante

ra (s Blacking out (z

- لیک از موارد زیر از نشانگان منفی، اسکنی و فرنسی است؟

الف) فقر محتوى، فكـ

ح) اختلال ته حمه

- اختلال و اندیشه که تا هم دست بسته بین احتمال کدام یک از مواد زیر

الف) بعثه جد، کاما بگشت بسما،

ح) زندگی مستقلاً

- شـ اگـهـ اختـلالـ هـذـيـانـهـ كـدـامـ يـكـ اـزـ مـهـارـدـ زـيـ عـامـاـ منـفـهـ مـحـسـوبـ مـهـ شـهـدـ؟ـ

الف) همیه دی، با افسس دگر ب) بوز سماوی

ج) جنسیت زن د) متأهلاً بودن

- میک از وینگ های زندگانی اف اد دارای حکایت saccadic حشمت نشده

الف) افادگه شهگذاری اعتماد به نفس باشد:

- ح) شخصیت اسکننده تابا، د) شخصیت و سه اس

میک حز و عه اما خط ساز بوز سایکم ده مبتلاهان به صع کانه نه

الله رب العالمين

- (+) شام و لایت دیک دیک (+) غایل ایکس

دیگر میتوانند این را در آن سایر اینستیتوشن‌ها نیز انجام دهند.

محرر Derailment, Inappropriate affect, Loosening of association او کدامیک از اینواع اسکیزوفرینیا برای

بیشتر مطرح است؟

- الف) پارانوئید ب) اشفته

ج) کاتاتونیک د) نامتمایز

-۳۳- وجود علایم و نشانه‌های اسکیزوفرنیا در بیماران post-encephalitis تاییدکننده کدام تئوری در پاتوفیزیولوژی

اسکیزوفرنیا است؟

- الف) کاهش فعالیت دوپامین
ج) افزایش فعالیت دوپامین

ب) کاهش فعالیت استیل کولین
د) افزایش فعالیت استیل کولین

۳۴- در بیماری که دچار اسکیزوفرنسی می‌باشد کدام عامل زیر موجب می‌شود که ما داروهای SDA (Serotonin-Dopamine Antagonist) را جهت درمان مدد نظر بگیریم؟

- (الف) افزایش وزن
- (ب) عالیم شناختی
- (ج) حاملگی
- (د) دیابت

۳۵- در مورد Bipolar disorder کدام جمله غلط است؟

- (الف) وجود حداقل ۴ حمله در یک سال
- (ب) در خانم‌ها بیشتر دیده می‌شود.
- (ج) داروهای ضدافسردگی روند عالیم را تشدید می‌کند.
- (د) بیشتر این افراد اختلال دو قطبی نوع یک دارند.

۳۶- در مطالعات همه‌گیرشناسی اختلال هذیانی کدام‌یک از یافته‌ها درست است؟

- (الف) میزان بالاتر اسکیزوفرنسی در بستگان بیمار
- (ب) میزان بالاتر اختلال خلقی در بستگان بیمار
- (ج) شیوع بالاتر آن از شیوع اختلال خلقی و اسکیزوفرنسی
- (د) شیوع بالاتر اختلال هذیانی در بستگان بیمار

۳۷- کدام‌یک از اختلالات زیر در تشخیص افتراقی اختلال هذیانی کمتر مطرح است؟

- (الف) بیماری آنرا یمز
- (ب) بیماری پیک
- (ج) بیماری آدیسون
- (د) بیماری دیابت

۳۸- در مورد سیستم نور ترانسمیتری درگیر در اسکیزوفرنسی کدام غلط است؟

- (الف) عمل آناتاگونیستی بر رسپتور_{5-HT₂} در کاهش عالیم سایکوتیک نقش دارد.

(ب) راههای مژولیمیبیک و مژوکورتیکال از مهم‌ترین مسیرهای نورونی درگیر در اسکیزوفرنسی هستند.

(ج) تجویز طولانی مدت آنتی‌سایکوتیک‌ها باعث کاهش فعالیت نورون‌های نورآدرنوبزیک لوکوس سرولتوس می‌شود.

(د) افزایش نسبی نورن‌های گابا ارژیک در هیپوکامپ مشاهده می‌شود.

۳۹- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص رفتار خشوت‌آمیز بیمار مبتلا به اسکیزوفرنسی غلط است؟

- (الف) تقاییص نورولوژیک احتمالاً بروز رفتار خشن از سوی بیمار را زیاد می‌کند.

(ب) درمان اورژانس شامل محدودسازی (Restraints) و جداسازی (Seclusion) می‌باشد.

(ج) لورازپام تزریقی می‌تواند مفید باشد.

(د) اگر پژشک در حضور بیمار احساس ترس کند بایستی با غلبه بر آن به مصاحبه خود ادامه دهد.

۴۰- در مقایسه بین اسکیزوفرنسی و اختلالاتی با توراث مندلی کدام گزینه به نفع اسکیزوفرنسی است؟

- (الف) مرز واضح بین افراد مبتلا و غیرمبتلا
- (ب) وجود فنوکپی

- (ج) عدم وابستگی به علل محیطی
- (د) نفوذ ژنی کامل

۴۱- کدام گزینه نادرست است؟

(الف) با در نظر گرفتن سن و جنس به نظر می‌رسد بیماران اسکیزوفرنسی چاق‌تر از عموم هستند.

(ب) اسکیزوفرنسی با افزایش خطر دیابت تیپ II همراه است.

(ج) خطر آرتربیت روماتوئید در اسکیزوفرنسی افزایش می‌یابد.

(د) بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) در بیماران اسکیزوفرنسیک بیش از جمعیت عمومی است.

٤٢- خانم ۲۰ ساله ای به طور ناگهانی از ۳ ماه پیش در تهایی صدای های می شنود که او را تهدید به کشتن می کنند. علی رغم اشتغال ذهنی نسبت به این صدایها، در طی این مدت عملکرد شغلی و اجتماعی مناسبی داشته است. در بررسی های طبی نکته ای دال بر وجود یک بیماری مشخص به دست نیامد. کدام تشخیص براساس DSM-IV-TR برای وی مطرح است؟

- (الف) Acute Schizophrenia-like psychotic disorder

- #### Simple Schizophrenia (۱)

- Schizophreniform disorder (ج)

- Psychosis NOS (5)

۴۳- اغلب افراد بی خانمان نوع خیابان‌گرد (Street People) دچار چه نوع اختلال روانپردازشکی هستند؟

- الف) اختلال شخصيت - وایستگی به مواد ب) اختلال خلقي - سوءصرف مواد

- ج) اسکین و فرنا - و استگے، به مواد د) و استگے، به مواد - مشکلات اقتصادی

۴۴- کدام عالمت زیر حزء علایم منفی اسکیزوفرنیا است؟

- Incoherency (بـ) Derailment (الفـ)

- Social inattentiveness (ذ) Nihilistic Delusion (ذ)

۴۵- در مطالعات اخیر، کدام داروی برای پیشگیری از رفتارهای خودکشی، در بیماران اسکیزوفرنیک توصیه شده است؟

- الف) كلو زايرز

- ج) الانزابين

۱۸- در مطالعه cohort که از سوئد بر روی ۵۰ هزار سرباز به منظور بررسی رابطه هوشی با اسکیزوفرنیا صورت گرفت و از سالگی تا ۳۰ سالگی مورد پیگیری قرار گرفتند، کدام یافته زیر حاصل گردید؟

- الف) بین ضریب هوشی پایین ۱۸-۶ سالگی یا پرور اسکیزوفرنیا در سالهای بعد رایطه قابلاً توجهی وجود دارد.

- ب) رابطه خطی مستقيم بین ریسک روز اسکیز و فرنیا یا ضریب هوشی وجود دارد.

- چ) ریسک بروز سایکوزهای غیراسکیزوفرینیا در کسانی که ضریب هوشی پایین‌تر دارند کمتر است.

- د) ارتباط بین ضرب هوشی، پایین و اسکین و فر نیا صرفاً تأثیر غیر مستقیم است.

۴۷- کدامیک از موارد زیر از قرائی دخالت احتمالی عفونت ویروسی در بیوکسینوفرا نیست؟

- الف) فزونی تعداد تولد بیماران اسکیزوفرنیک در اوخر تابستان و اوایل پاییز

- ب) رابطه بين مراجعه يا همه گيري ويروسجي در رحم و پروز بعدی اسکیز و فرنيا

ج) احتمال بالاتر داشتن خواهر و برادر اسکیزوفرنیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مقایسه با گروه شاهد

- د) تغییرات جغرافیایی در شیوه اسکنیونریا در نواحی از خط استوا

۴۸- همه موارد زیر از ویژگی‌های پیش‌آگهی خوب در اختلال اسکیزوفرنی فرم هستند به جز:

- الف) بروز علایم پسیکوتیک در طی کمتر از ۴ هفته از اولین تغییرات قایلاً توجه رفتاری

- ب) وجود گیجی و منگی (Confusion and perplexity) در زمان اوج علایم پسیکوتیک

- ج) عملکرد اجتماعی و شغلی خوب قبل از پروژه پیماری

- د) وجود عاطفه کند و یا سطحي

۴۹- کدام یک از موارد زیر در مورد همه گیرشناختی اسکیزوفرنیا غلط است؟

- الف) در زنان توزیع سنی اسکیزوفرنیا به صورت دونمایی (Bimodal) است.

۵۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد توهمنات بینایی در اسکیزوفرنی صحیح است؟

الف) بیشتر اوقات تؤمن با سایر توهمنات است. ب) اغلب شب‌ها بروز می‌کنند.

ج) اصولاً نادر هستند. د) معمولاً ثابت، بدون تحرک و تک‌بعدی هستند.

۵۹- در خودکشی بیماران اسکیزوفرنی وجود کدام یک از موارد زیر نقش بیشتری دارد؟

الف) افسردگی ب) توهمندی آرمانه

ج) هذیان‌گزند و آسیب د) اوایل تخریص از بیمارستان

۶۰- در مطالعات نورا یمونولوژی در اسکیزوفرنی تغییراتی در بعضی نشانگرهای ایمنی گزارش شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد این تغییرات نادرست است؟

الف) افزایش سطح Interleukin 2 Interferon

ج) کاهش گیرنده ۲ Interleukin 2 CSF

۶۱- در تشخیص گذاری براساس DSMIV کدام یک از ملاک‌های زمانی زیر نادرست است؟

الف) Brief Psychotic Disorder حداقل یک هفته - حداقل یک ماه

ب) Schizophreniform Disorder حداقل یک ماه و کمتر از شش ماه

ج) Delusional Disorder حداقل یک ماه

د) Schizophrenia حداقل شش ماه

۶۲- در تحلیل این باور برخی بیماران اسکیزوفرنیک که والدین آنها حقیقی نیستند بر کدام یک از موارد زیر تأکید شده است؟

الف) احساس وحشت از دادن آنها ب) واکنش به رفتار بیش‌حمایتی آنها

ج) احساس طردشدنی د) بدست آوردن توجه بیشتر

۶۳- بیمار ۱۸ ساله‌ای از ۸ ماه قبل، چهار اختلال رفتاری و تفکر شده است. سوء‌ظن و بدینه دارد و به شدت بی قرار است.

گه گاه صحبت نمی‌کند. آشغال از روی زمین برداشته و می‌خورد. کدام تشخیص براساس طبقه‌بندی DSMIV-TR محتمل‌تر است؟

الف) اسکیزوفرنیای کاتاتونیک ب) اسکیزوفرنیای نامتمایز

ج) اسکیزوفرنیای ساختار گسیخته د) اسکیزوفرنیای ساده

۶۴- خانم ۳۰ ساله‌ای چهار توهمندی شناوری پایدار که بیماری او از یک سال گذشته است. سوء مصرف مواد ندارد و افسرده نیست، کدام تشخیص مطرح است؟

الف) اسکیزوفرنیای نامتمایز ب) سایکوز NOS

ج) اسکیزوافکتیو د) سایکوز خلائقی

۶۵- شناخت بیماران در خطر اسکیزوفرنی در مرحله پرودرمال (پیش‌درآمدی) و درمان آنها جزء کدام دسته پیشگیری می‌باشد؟

الف) Indicated Prevention ب) Selective Prevention

ج) Tertiary Prevention د) Universal Prevention

۶۶- بر اثر مطالعه (British National Psychiatric Survey) Wiles et al. کدام فاکتور ریسک گزارش عالیم سایکوز را به طور معنی‌دار افزایش می‌دهد؟

الف) زندگی در روستا ب) قطع مصرف تنباقو

ج) سن بالا د) جنس مؤنث

عبارت است از: Schizotaxia-۶۷

- الف) زینه ژنتیکی که فرد را مستعد اسکیزوفرنی یا اسکیزوفرنیا می‌کند.
- ب) سندرمی که اختلالات شناختی پیشرونده در بیمار اسکیزوفرنیا ایجاد می‌کند.
- ج) عالیم مثبت سایکوز در نزدیکان بیماران اسکیزوفرنیا
- د) نوعی از اختلال اسکیزوفرنیاست که سیر بسیار سریع و پیشرونده دارد.

۶۸- کدام یک جزء عالیم مثبت اسکیزوفرنی نیست؟

- | | |
|-----------------|-----------------|
| الف) Derailment | ب) Illogicality |
|-----------------|-----------------|

- | | |
|----------------|-------------|
| ج) Incoherence | د) Blocking |
|----------------|-------------|

۶۹- کدام یک از عبارات زیر درباره هذیان‌های هیپوکندریائی صحیح است؟

- الف) در اختلال افسردگی دیده می‌شود.
- ب) در هیپوکندریازیس دیده می‌شود.
- ج) علامت اصلی در سندرم کوتارد است.
- د) در اختلال بدشکلی بدن BDD دیده می‌شود.

۷۰- اختلال تفکر در بیماران اسکیزوفرنیا با همه موارد زیر مشخص می‌شوند. به جز:

- | | |
|---------------|------------------|
| الف) Delusion | ب) Confabulation |
|---------------|------------------|

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| ج) Loss of ego boundary | د) Sexual confusion |
|-------------------------|---------------------|

۷۱- گزینه صحیح در رابطه با عوامل مؤثر بر عود اختلال اسکیزوفرنیا کدام است؟

- الف) عدم مصرف منظم دارو
- ب) محیط پر از انتقاد
- ج) سابقه استرس ناگهانی
- د) همه موارد فوق

۷۲- در اختلال اسکیزوافکتیو تمام موارد زیر دلالت بر پیش‌آگهی بدارند، به جز:

- الف) عدم وجود فاکتور آشکارکننده
- ب) ارجحیت عالیم سایکوتیک
- ج) وجود عالیم مانیا
- د) شروع زودرس

۷۳- کدام یک از موارد زیر از سواب تایپ‌های اختلال هذیانی (Delusional Disorder) در DSM-IV-TR نیست؟

- | | |
|----------------|----------------|
| الف) Reference | ب) Eerotomanic |
|----------------|----------------|

- | | |
|------------|----------------|
| ج) Somatic | د) Grandiosity |
|------------|----------------|

۷۴- پدیده Stalking در کدام یک از انواع اختلال هذیانی دیده می‌شود؟

- الف) Somatic
- ب) Grandiose
- ج) Jealous
- د) Eerotomanic

۷۵- کدام یک جزء ویژگی non-Deficit Schizophrenia نسبت به نوع Schizophrénia Deficit است؟

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| الف) Excess of winter births | ب) Less familial risk of schizophrenia |
|------------------------------|----------------------------------------|

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ج) Decreased risk of drug abuse | د) Less cognitive impairment |
|---------------------------------|------------------------------|

۷۶- گزینه صحیح در مورد Simple Deteriorative Disorder کدام است؟

- الف) بی‌خانمانی شایع است.
- ب) توهمندی شایع است.
- ج) هذیان واضح دیده می‌شود.
- د) معمولاً زود تشخیص داده می‌شود.

۷۷- بیمار خانم ۴۰ ساله‌ای است که از چند روز پیش دچار رفتارهای غیرعادی به صورت داد زدن، خنده‌یدن، سر به دیوار کوبیدن، آواز خواندن و گریه شده است. اطرافیان معتقدند که رفتارهای او بیماری روانی نیست بلکه در اثر تسبیب

ارواح به وجود آمده و تنها بدليل امتناع از غذا خوردن و بی اشتھایی او را به نزد پزشک آورده‌اند. در فرهنگ بومی بیمار این حالات چه نام دارد؟

(الف) بوفه دلیران (Amok) (Boufe Delirante)

(ج) زار (Zar) (Evil Eye)

۷۸- بیماری حین مصاحبه می‌گوید «جوانی مانند اریاب رجوع است، مانند کتابداری شده بود. من به آنها گفتم پرواز کنید» وقتی از او سؤال می‌شود منظورش چیست؟ می‌گوید: مقصودم واضح است. به او گفته می‌شود که بخش‌های مختلف صحبت‌هایش ارتباطی به هم ندارد. می‌گوید «صحبت کردن من ایرادی ندارد» این مجموعه رفتاری.....

(الف) نوعی Flight of Idea است.

(ب) علامت سایکوز است.

(ج) دلالت بر Thought Insertion می‌کند.

(د) نشان دهنده سطح بالای اضطراب است.

۷۹- کدام‌یک از ویژگی‌های ذیل خصوصیت یک سایکوز interictal اپی لپسی نیست؟

(الف) Atypical paranoid psychosis

(ب) Less religiosity than schizophrenia

(ج) More positive as opposed to negative symptoms

(د) Negative family history for psychosis

۸۰- مرد ۳۲ ساله‌ای را به علت بدینی شدید به اورژانس آوردۀ‌اند. وی حین مصاحبه با تعبیرات بدینانه و تمثیل‌کننده سعی می‌کند مصاحبه‌گر را تحقیر و شرم‌منده کند. مصاحبه‌گر، موضوع مورد گفت‌وگو را عوض می‌کند ولی بیمار به همان روش ادامه می‌دهد. انتخاب کدام‌یک از روش‌های زیر توسط درمانگر را ترجیح می‌دهید؟

(الف) سعی در برقرار کردن رابورت با استفاده از شوخی

(ب) تهدید بیمار به تزریق داروهای آرامبخش

(ج) تهدید بیمار به بستری نمودن وی

(د) ختم مصاحبه

۸۱- مرد ۴۵ ساله با تشخیص اختلال هذیانی از حدود یک‌سال قبل تحت درمان با ۲ میلی ریسپریدون قرار دارد. او از یک هفته قبل بدون سابقه قبلی علایم تشخیصی مانیا را نیز پیدا کرده است. تشخیص براساس DSM-IV-TR چیست؟

(الف) اختلال هذیانی NOS

(ج) اختلال دوقطبی NOS

۸۲- بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید بدليل حرکات غیرارادی مراجعه کرده است. او از یک سال قبل تزریق داروی ضدپسیکوز «هر ماه یک عدد مدیکیت (فلوفنازین دکانوات)» تحت درمان بود. او بعد از بهبودی نسبی دارو را قطع و پس از آن چهار حرکات غیرارادی دور لب، مکیدن، ملچ ملوج کردن، شکلک درآوردن و حرکات نامنظم در اندام‌ها و شکم شده است. برای کاهش عوارض فوق کدام‌یک مؤثرتر است؟

(الف) کلوزایین

(ب) کرئیتیاپین

(ج) اولانترایپن

(د) زیپرازیدون

۸۳- جوان ۲۵ ساله بدليل گیجی مراجعه کرده است. او از سه ماه قبل، پس از دیدن خوابی ترسناک، مدتی تصور می‌کرد روحش از جسمش جدا شده است و چهار بی اشتھایی، بی خوابی و بی انگیزگی برای انجام کار شده است. تجربه فوق نزدیک به کدام‌یک از سندروم‌های وابسته فرهنگ است؟

الف) Brain fag
ب) zar

ج) Susto
د) Spell

۸۴- کدام یک از موارد زیر در مورد اسکیزووتاکسیا درست است؟
الف) در طبقه‌بندی DSM-IV-TR آمده است.

ب) برای اولین بار توسط لئونارد توصیف شده است.

ج) اکثرًا به اسکیزوتابی و اسکیزوفرینا منجر می‌شود.

د) ارتباطی با طیف اسکیزوفرینیا ندارد.

۸۵- کدام یک از موارد زیر در هر دو مقیاس‌های PANSS و BPRS برای علایم منفی وجود دارد؟

الف) اشکال در نقکر انتزاعی
ب) گُندی عواطف

ج) دوری‌گرینی اجتماعی
د) برقراری رابطه ضعیف

۸۶- کدام یک از گرینه‌های زیر از علایم درجه اول اشنازیدر نیست؟

الف) Thought Insertion
ب) Thought Broadcasting

ج) Thought Alienation
د) Thought Withdrawal

۸۷- در ارتباط با مطالعه IPSS (مطالعه پیش‌آهنگ بین‌المللی اسکیزوفرنیا) توسط WHO کدام یک از علایم زیر جزء شایع‌ترین

علایم مشاهده شده در تمام مرآکز تحقیق نبوده؟

الف) بیپش ضعیف
ب) خلق هذیانی

ج) عاطفه سطحی
د) درک هذیانی

۸۸- بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی که در مرآکز توانبخشی نگهداری می‌شوند. معمولاً تمایل به بیکار نشستن و خودداری از انجام تکالیف اولیه دارند. چنانچه درمانگری از این بیماران بخواهد که به ازای هر ده دقیقه نشستن، کار معینی را انجام دهند و از این شیوه، نتیجه مطلوبی به دست آورد، از کدام اصل استفاده شده است؟

الف) تقویت اتفاقی adventitious reinforcement

ب) اصل پره ماک premack's principle

ج) شکل‌دهی رفتار shaping behaviour

د) مهار بیزار سازانه aversive control

۸۹- بیمار دختر ۱۶ ساله‌ای است که از ۷ ماه پیش دچار افت تحصیلی، گوشه‌گیری، رفتارهای وسواس‌گونه و شنیدن

صدای‌ای که دائمًا از رفتارهای او انتقاد می‌کردند و او را تهدید می‌کردند شده است. ۲ ماه بعد از شروع علایم برای

اولین بار به روانپژشک مراجعه کرده و برای او رسپریدون با دوز ۳ میلی‌گرم در روز شروع شده است. در حال حاضر

علایم خفیف‌تر شده‌اند ولی بیمار دچار کندی ابراز عواطف و فقدان انگیزه نیز گردیده است. کدام جمله در مورد

تشخص غلط است؟

الف) براساس معیارهای ICD-10 در همان مراجعه اول تشخیص اسکیزوفرنیا قابل قبول بوده است.

ب) براساس معیارهای DSM-IV-TR تنها در ویزیت اخیر می‌توان تشخیص اسکیزوفرنیا را مطرح نمود و نه در

ویزیت اول.

ج) چون علایم منفی پس از شروع دارو ظاهر شده‌اند، براساس DSM-IV-TR نمی‌توان تنها با یک علامت

پسیکوتیک تشخیص اسکیزوفرنیا را مطرح نمود.

د) "ابراز عواطف کند" و "فقدان انگیزه" هیچ نقشی در تشخیص بیماری ندارد چون پس از مصرف دارو واقع شده است.

۹۰- خانمی میانسال و بی سواد که از دو ماه پیش دچار پرحرفی، بی قراری، بی خوابی و اعتقاد به ارتباط با ائمه شده، در بخش روانپزشکی بستری گردید. پس از رفع علایم ذکر شده در هنگام ترخیص تنها علامت باقی مانده که به پژوهش خود ابراز داشت این بوده که نویسنده سرشناسی که در همسایگی او زندگی می‌کند از پنج سال پیش به او عشق می‌ورزد ولی جرأت ابراز آن را ندارد و اکنون نیز مطمئن است که بی صبرانه منتظر بازگشت او می‌باشد. به عقیده شما صحیح ترین تشخیص مطرح شده براساس DSM IV کدام یک از موارد زیر است؟

ب) Schizoaffective

الف) Schizophrenia

د) Psychotic Disorder NOS

ج) Delusional disorder

۹۱- می خواهیم بدانیم که عدم تغذیه با شیر مادر ریسک فاکتور اسکیزوفرنیای بعدی هست یا خیر؟ به این منظور ۲۰۰ بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا را با ۲۰۰ فرد مشابه نرمال از نظر سابقه تغذیه با شیر مادر مقایسه می‌کنیم از کدام شاخص آماری برای نشان دادن یافته‌های مرتبط استفاده می‌کنیم؟

ب) Roc curve

الف) Incidence

د) Odds ratio

ج) Risk Ratio

۹۲- بیماری که دارای حالت سوء‌ظن است و به شدت بدگمان است، به مطابق شما مراجعت می‌کند. کدام یک از اقدامات زیر در برخورد با بیمار نادرست است؟

الف) به بیمار احترام گذاشته ولی تا حدودی رسمی برخورد می‌کنید.

ب) هر برنامه درمانی را با تفصیل و کامل برای بیمار توضیح می‌دهید.

ج) برای ایجاد رابطه درمانی مناسب و رفع سوء‌ظن، گرمی و صمیمیت از خود نشان می‌دهید.

د) کوشش می‌کنید در واکنش به سوء‌ظن بیمار آرام بوده و حالت دفاعی به خود نگیرید.

۹۳- خانم ۲۱ ساله به دنبال صحبت‌هایی که از طرف خانواده در مورد ازدواج او با مردی ۲۵ سال مسن‌تر از او شده بود، از پنج ماه و نیم قبل علایمی از قبیل اضطراب، افسردگی، گوشش‌گیری داشته است. وی به دنبال ازدواج از دو هفته پیش به ایلوژن‌ها و هذیان‌های نیست‌انگارانه‌ای دچار شده است که اکنون به اوج رسیده است و روزی‌به روز متغیر است و با احساسات شدید اما کوتاه‌مدت شادی و جذبه همراه است. سابقه‌ای از نابسامانی‌های خلقی یا اسکیزوفرنیا در خانواده وجود ندارد. سوابقی از مصرف مواد یا بیماری دیگر در شش ماه اخیر گزارش نشده است. محتمل ترین تشخیص عبارت است از:

الف) اسکیزوفرنیا (Schizophrenia)

ب) نابسامانی دوقطبی همراه با ویژگی‌های روانپریشانه (bipolar mood disorder with psychotic features)

ج) نابسامانی روانپریشانه حاد و گذرا (acute and transient psychotic disorder)

د) نابسامانی اسکیزوفرنی فرم (schizophreniform disorder)

۹۴- مرد ۳۰ ساله‌ای مبتلا به اسکیزوفرنی و در عین حال معتمد به هروئین است. کدام شیوه درمان برای او مؤثرتر است؟

الف) درمان هر دو اختلال به طور همزمان و به وسیله تیم درمانی واحد

ب) ابتدا درمان اعتیاد در یک بخش تخصصی، سپس درمان اسکیزوفرنی در بخش دیگر

ج) ابتدا درمان اسکیزوفرنی در یک بخش روانپزشکی سپس درمان اعتیاد در بخش دیگر

- ۹۵- خانم ۳۰ ساله‌ای از سال‌ها پیش معتقد است که همسایه‌ها با او دشمنی دارند ولی خانواده او چنین اعتقادی ندارند. در هر سال حدود ۶ تا ۷ ماه نیز علایم افسردگی در او ایجاد می‌شود ولی اعتقاد قبلی همچنان پابرجاست. کدام تشخیص از نظر DSM-IV-TR برای این فرد مناسب‌تر است؟
- (الف) Schizophrenia
 (ب) Psychotic Disorder NOS
 (ج) Major Depressive Disorder (with psychotic feature)
- ۹۶- بیماری اسکیزوفرنیک معتقد است که وارث تمام دارایی بن‌لادن است. در عین حال از زندگی در بخش روان‌پژوهیک یک بیمارستان قدیمی هیچ اظهار ناراحتی نمی‌کند. کدام‌یک از موارد زیر با وضعیت این بیمار همانگ است.
- (الف) Delusion of grandiosity
 (ب) Delusion of persecutory delusion
 (ج) Shared delusion
- ۹۷- احتمال بروز Brief psychotic Disorder در کدام‌یک از اختلالات شخصیتی زیر کمتر است؟
- (الف) Schizotypal
 (ب) Avoidant
 (ج) Histrionic
- ۹۸- کدام‌یک از بیانات زیر در مورد اپیدمیولوژی اختلال اسکیزوفرنیا صحیح است؟
- (الف) به طور کلی در جنس مذکور دیرتر شروع می‌شود و پیش‌آگهی بهتر است.
 (ب) متولدین فصل گرم سال بیشتر مستعد ابتلاء آن هستند.
 (ج) میزان تولیدمثل این بیماران با مقایسه با جمعیت عمومی کمتر است.
 (د) هر چه جمعیت محیط زندگی فرد کمتر باشد احتمال ابتلا کمتر می‌شود.
- ۹۹- بیماری اسکیزوفرنیک معتقد است که بقال سر کوچه قصد مسموم کردن او را دارد. در ضمن عقیده دارد ۸ سال قبل نیز یکبار پس از خوردن غذایی مسموم شده بود که مواد آن از همین بقال تهیه شده بود. چه علامتی در این شرح کوتاه قابل طرح است؟
- (الف) Delusional perception
 (ب) Delusional memory
 (ج) Double orientation
- ۱۰۰- در بیمار مبتلا به پارافرنیا کدام‌یک از موارد زیر شایع‌تر است؟
- (الف) سابق خانوادگی اسکیزوفرنیا
 (ب) هذیان‌های سوماتیک
 (ج) اختلال حافظه نزدیک
 (د) توهمات شناوری سوم شخص
- ۱۰۱- کدام‌یک از ویژگی‌های زیر در تیپ I اسکیزوفرنیا دیده می‌شود؟
- (الف) Affective flattening
 (ب) Poverty of speech
 (ج) Blocking
- ۱۰۲- بیماری به طور اورژانس توسط خانواده به شما ارجاع می‌شود. در معاینه روانی متوجه می‌شوید که وی در حالت شبه‌رویابی عمیقی قرار دارد به طوری که جهت‌یابی زمانی و مکانی خود را از دست داده است و عمیقاً در تجارب توهماتی خود درگیر است. محتمل‌ترین تشخیص شما کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟
- (الف) Oneiroid schizophrenia
 (ب) Paraphrenia
 (ج) Simple Deteriorative Disorder

۱۰۳ - رفتار متناقض (Paradoxical conduct) در کدام‌یک از انواع اختلال هذیانی مشاهد می‌شود؟

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ب) Somatic type | الف) Erotomanic type |
| ج) Jealous type | ج) Grandiose type |

۱۰۴ - بیماری با اعتقاد به تسخیر شدن توسط ارواح، دوره‌های تجزیه‌ای به صورت فریاد کشیدن، خندیدن، کوبیدن سر به دیوار، گریه و آواز پیدا می‌کند. غذا نمی‌خورد و بی‌حال و مردم‌گریز شده است. این شکل بالینی در کدام‌یک از سندروم‌های وابسی به فرهنگ زیر توصیف شده است؟

- | | |
|----------------------|----------------|
| ب) Ataque de nervios | الف) Brain fag |
| ج) Spell | ز) Zar |

۱۰۵ - از دیدگاه Sidney Blatt نوع روان درمانی برای افسردگی نوع introjective کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف) برقراری روابط گرم توأم با پذیرش از جانب درمانگر به منظور ترمیم اعتماد به نفس بیمار

ب) مداخله‌های تعبیر (interpretive interventions) به منظور ایجاد بینش در بیمار

ج) برقراری اتحاد درمانی قوی به منظور دوام رابطه درمانی درازمدت

د) آموزش مهارت‌های اجتماعی از جمله برقراری روابط با دیگران برای ارتقاء سطح کارآیی اجتماعی

۱۰۶ - کدام سیر زیر در اسکیزوفرنی شایع‌تر است؟

الف) اپی‌زودیک با عالیم باقیمانده بین دوره‌ها

ب) اپی‌زودیک بدون عالیم باقیمانده بین دوره‌ها

ج) مداوم (بدون عود)

۱۰۷ - در یکی از نظریه‌های پویایی خانواده بیمار دچار اسکیزوفرنیا اظهار می‌شود که در خانواده این بیماران فرزندان بیماران های ضد و نقیض در مورد رفتارشان از پدر و مادر دریافت می‌کنند. کدام‌یک از نظریه‌پردازان زیر این مفهوم را ارائه کرده است؟

الف) Julian Leff (ب) Theodore Iidz

ج) Gregory Bateson (د) Lymann Wynne

۱۰۸ - در مورد سیگار کشیدن بیمار اسکیزوفرنیا کدام‌یک از عبارات زیر غلط است؟

الف) بیش از $\frac{3}{4}$ بیماران اسکیزوفرنیا سیگار می‌کشند.

ب) بیماران سیگاری معمولاً از دراز بیشتر آنتی‌سایکوتیک استفاده می‌کنند.

ج) پارکینسونیسم ناشی از داروهای آنتی‌سایکوتیک در این بیماران بیشتر دیده می‌شود.

د) عالیم مثبت در بیماران اسکیزوفرنیای سیگاری کمتر دیده می‌شود.

۱۰۹ - مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای بسترهای نشان داده است کدام‌یک از شاخص‌های زیر با انجام روش‌های توانبخشی مبتنی بر اصول رفتاری، بهبودی بیشتری داشته است؟

الف) Non Compliance (ب) Social isolation

ج) Poor self-care (د) Verbal aggression

۱۱۰ - سابقه فامیلی اسکیزوفرنیا جزء ملاک‌های تشخیصی کدام‌یک از طبقه‌بندی‌های زیر است؟

الف) St. Louis Criteria (ب) Gabriel Langfeldt Criteria

ج) New Haven Schizophrenia Index (د) Flexible System

۱۱۱- در کدام یک از اختلالات زیر، برای استیل کولین نقشی تعریف نشده است؟

- الف) اختلالات خلفی
- ب) بیماری آلتزاپر
- د) اختلالات خواب
- ج) اختلالات اسکیزوفرنیک

۱۱۲- در جریان مصاحبه با بیمار پسیکوتیک، کدام یک از گزینه‌های زیر را در ارتباط با بیمار مناسب نمی‌دانید؟

الف) فکر نمی‌کند صدای تهدیدکننده‌ای که گفتید می‌شنوید، از افکار خودتان منشأ می‌گیرد؟

ب) می‌توانیم راجع به بدینهایی که پیدا کرده‌اید بیشتر صحبت کنیم؟

ج) آنچنان که گفتید به نظر می‌رسد افرادی قصد صدمه‌زن به شما را دارند؟

د) حتی فکر اینکه آدم‌هایی که شما را نمی‌شناسند بر علیه شما برنامه‌ریزی کرده باشند هم ترسناک است.

۱۱۳- یکی از همکاران پرستار به شما مراجعه و اظهار می‌دارد که برادرش دچار رفتارهای سایکوتیک جدی شده است و خواستار بستری شدن اجباری او می‌شود. کدام یک از اقدامات زیر را از نقطه نظر اخلاقی مناسب‌تر تشخیص می‌دهید؟

الف) نوشتن معرفی‌نامه برای پذیرش و بستری شدن بیمار در بخش روانپزشکی

ب) تجویز داروی آرامبخش بهمنظور تسهیل درآوردن بیمار به درمانگاه

ج) درخواست برای ویزیت حضوری بیمار و اتخاذ تصمیم بعدی

د) درخواست از پلیس جهت جلب بیمار و ارجاع او به درمانگاه

۱۱۴- شیوع در طول عمر (Lifetime Prevalence) در مورد مرگ و میر ناشی از خودکشی برای بیماران دچار اسکیزوفرنیا چند درصد است؟

الف) ۱۰

ب) ۲۰

ج) ۳۰

د) ۴۰

۱۱۵- نوجوان ۱۷ ساله به دلیل ترک تحصیل همراه پدرش مراجعه کرده است. او از یک سال پیش افت تحصیلی پیدا کرده و به لحاظ شکلک درآوردن یکباره به طوری جدی توسط معلم تنبیه شده است. در بررسی روانی عواطف او سطحی، لبخندی‌های بی‌مورد، اشتغال ذهنی در مورد چراگی هستی و نیستی دارد. نامصمم، بی‌اراده و بی‌هدف است. اختلال فرم فکر دارد. گاهی دچار هذیان و توهمندی شود. از نظر طبقه‌بندی تشخیص ICD-10 چه نوع اسکیزوفرنیا دارد؟

الف) هبه‌فرنی

ب) ساده

ج) رزیدوال (باقی‌مانده)

د) دفیسیت (کمبودی)

۱۱۶- از نظر تئوری سایکوادینامیک، کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی در ایجاد اختلالات هذیانی مطرح نشده است؟

الف) Undoing

ب) Denial

ج) Reaction Formation

د) Projection

۱۱۷- کدام یک درباره Psychosis صحیح نمی‌باشد؟

الف) عدم بصیرت به توهمنات دلیل بر سایکوزیس است.

ب) ممکن است رفتار سایکوتیک بدون حالت سایکوزیس دیده شود.

ج) اختلال واقعیت‌سننجی خفیف، علامت سایکوزیس است.

د) رفتار به تنهایی می‌تواند دلیلی بر اختلال در واقعیت‌سننجی باشد.

۱۱۸- برای تشخیص کاتاتونیک اسکیزوفرنیا علاوه بر داشتن ملاک‌های عمومی اسکیزوفرنیا حداقل چه مدت تداوم علایم کاتاتونیا ضرورت دارد؟ (طبق معیارهای ICD₁₀)

الف) یک هفته
ب) دو هفته
ج) سه هفته
د) چهار هفته

۱۱۹ - مرد ۲۷ ساله‌ای مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در بیمارستان اظهار می‌دارد که کادر درمانی درمانگران واقعی نیستند بلکه چهره‌های متفاوت فردی است که قصد آسیب رساندن به او را دارد. کدام یک از علایم زیر را دارد؟

الف) کاپگراس (Capgras) (Intermetamorphosis)

ج) دابل گانگر (Doppel ganger) (Fregolie)

۱۲۰ - وجود کدام یک از موارد زیر، معادل پیش‌آگهی بد در اختلال هذیانی می‌باشد؟

الف) هذیان بزرگ‌منشی
ب) سن پایین

ج) جنس مؤنث
د) شروع حاد

۱۲۱ - در مورد نتایج شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا همه موارد زیر صحیح است به جزء:

الف) فاکتوری پیش‌بینی‌کننده برای سطح عملکرد بیمار است.

ب) ابزاری برای تشخیص اسکیزوفرنیاست.

ج) در تصمیم‌گیری برنامه درمانی نقش دارد.

د) در دوره باقیمانده بیماری ادامه می‌یابد.

۱۲۲ - همه عوامل زیر به عنوان risk factor خودکشی در بیماران اسکیزوفرنیک محسوب می‌گردند به جزء:

الف) Brief Psychotic

ب) Schizophriform

ج) Borderline Personality

د) Schizotypal Personality

۱۲۳ - احتمال ویزیت اولیه توسط روانپزشک در کدام اختلال هذیانی زیر بیشتر است؟

الف) حسادت
ب) بزرگ‌منشی

ج) شهوانی
د) جسمانی

۱۲۴ - همه عوامل زیر به عنوان risk factor خودکشی در بیماران اسکیزوفرنیک محسوب می‌گردند به جزء:

الف) انزوا

ب) افسردگی

ج) کم‌سوادی

۱۲۵ - فاصله زمانی بین کدام‌یک از مراحل زیر است؟ Duration of untreated psychosis

الف) پرمهوریید تا شروع درمان

ب) پرودرمال تا شروع درمان

ج) اولین مراجعته تا شروع درمان

د) شروع پسیکوز تا شروع درمان

۱۲۶ - کدام گزینه در مورد eye movement dysfunction در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا صحیح است؟

الف) Trait marker

ب) State marker

ج) به نفع پاتولوژی لوب تمپورال است.

د) در نیمی از مبتلایان به سایر اختلالات روانی هم دیده می‌شود.

۱۲۷ - شایع‌ترین و مشکل‌ترین تشخیص افتراقی اسکیزوفرنیا با کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف) فازمانیک اختلال دوقطبی

ب) افسردگی مائرور با عالیم سیکوتیک

ج) اختلال شخصیت مرزی با دوره‌های کوتاه سایکوز

د) فاز پرودرمال با عالیم و سواسی

۱۲۸ - الگوی استرس دیاتز در شکل‌گیری اسکیزوفرنیا اشاره به کدام مورد است؟

الف) غلبه نقش استرسی بر وراشت ب) عدم ارتباط استرسی با وراشت

ج) تعامل بین استرس و وراشت د) غلبه وراشت بر استرس

۱۲۹ - شل شدن واضح تداعی‌ها در کدام‌یک از انواع اسکیزوفرنیا محتمل‌تر است؟

الف) Catatonic ب) Paranoid

ج) Disorganized د) Residual

۱۳۰ - در Social skill training بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، کدام‌یک از اهداف زیر کمتر قابل وصول است؟

الف) کاهش تظاهرات غیرعادی چهره

ب) کاهش عود و بسترهای بیماران

ج) درک حالات عاطفی و هیجانات توسط بیمار

د) رساندن بیمار به عملکرد پایه

۱۳۱ - در پیش‌آگهی اختلالات هذیانی کدام صحیح است؟

الف) شروع تدریجی شایع‌تر از شروع ناگهانی است.

ب) جنسیت فرد نشانگر پیش‌آگهی مناسب‌تری است.

ج) شروع قبل از سی سالگی نشانگر پیش‌آگهی خوب است.

د) تعداد کمی از بیماران در پیگیری درازمدت خوب می‌شوند.

۱۳۲ - کدام مورد بر علیه نظریه شباهت اسکیزوفرنی فرم به اسکیزوفرنی است؟

الف) نقص تحریک در ناحیه پیش فرونتال تحتانی در تست ویسکانسین

ب) اختلال در منع فعالیت استریاتال که محدود به نیمکره چپ است.

ج) ارتباط دیلاتاسیون بطنی و سایر مقیاس‌های بیولوژیک

د) عدم وجود عالیم درجه اول اشنایدری در اسکیزوفرنی فرم

۱۳۳ - در اختلال اسکیزوفرنیا کدام‌یک از موارد زیر با افزایش خطر اقدام به خودکشی همراه است؟

الف) Poor cognitive function ب) Poor insight

ج) Poor socioeconomic background د) Poor social function

۱۳۴ - معادل کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟ BORDERLINE SCHIZOPHRENIA

الف) Paraphrenia ب) Oneiroid Schizophrenia

ج) Latent Schizophrenia د) Pseudoneurotic Schizophrenia

۱۳۵ - کدام‌یک در خصوص اپیدمیولوژی اختلال اسکیزوافکتیو صحیح نمی‌باشد؟

الف) نوع افسرده این اختلال در افراد مسن شایع‌تر از جوانان است.

ب) شیوع اختلال در مردان کمتر از زنان متأهل گزارش شده است.

ج) سن شروع اختلال در زنان کمتر از مردان است.

د) مردان مبتلا به طرز بارزی عاطفه Flat یا نامناسب دارند.

۱۳۶ - در بیماران مبتلا به deficit schizophrenia نسبت به دیگر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا کدام مورد صحیح است؟

- (الف) همراهی بیشتر اختلال اضطرابی
- (ب) شیوع بیشتر در زنان
- (ج) همراهی کمتر سوءمصرف مواد
- (د) کیفیت زندگی بهتر قبل از بیماری

۱۳۷ - در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا کدام صحیح است؟

(الف) میزان دیگرکشی در آنان برابر جمعیت عمومی است.

(ب) بیشتر خشونت‌های اجتماعی منتبه به آنان است.

(ج) بیماران مبتلا بیشتر قریانی خشونت می‌شوند.

(د) اقدام به خشونت نسبت به دیگر بیماری‌های روانپزشکی به طور برجسته‌ای بیشتر است.

۱۳۸ - در مورد اختلال بویایی و سیر اسکیزوفرنیا کدام صحیح است؟

(الف) شدت این اختلال با پیشرفت اسکیزوفرنیا کاهش می‌یابد.

(ب) شدت اختلال بویایی با شدت بیماری اسکیزوفرنیا مرتبط است.

(ج) این اختلالات در شروع بیماری وجود دارد.

(د) درمان بیماری اسکیزوفرنیا بر شدت این علامت تأثیر می‌گذارد.

۱۳۹ - حداقل زمان لازم برای تشخیص اختلال هذیانی در ICD-10 و DSM-TR به ترتیب عبارت است از:

(الف) یک ماه و یک ماه

(ب) سه ماه و سه ماه

(ج) سه ماه و یک ماه

۱۴۰ - آقای ۱۶ ساله‌ای، راست دست، از دو سال قبل چار تشنج با منشأ لوب‌تمپورال راست شده است. کدام مورد زیر در این

بیمار، عامل خطر برای بروز علایم سایکوتیک محسوب می‌گردد؟

(الف) جنس

(ب) سن شروع

(ج) محل ضایعه در سمت راست

(د) راست دست بودن

۱۴۱ - از دیدگاه کرپلین کدام یک از علایم زیر پاتوگنومونیک پیش‌آگهی بد در مبتلایان به اسکیزوفرنیا می‌باشد؟

(الف) Concreting

(ب) Loosening of association

(ج) Mannerism

(د) Delusion of control

۱۴۲ - آقای ۲۷ ساله‌ای که از ۷ ماه قبل رفتارهای عجیب داشته به دلیل آژیتاپسیون، بی‌خوابی و تحریک‌پذیری شدید در

اورژانس روانپزشکی بستری شده است. از یک ماه قبل علایمی مانند پُرحرفي، توهم شناوی، خشنده‌های بی‌دلیل،

Posture غیرطبیعی و راه رفتن و دویین بسی هدف در روی گزارش شده است. کدام‌یک از تشخیص‌های زیر

محتمل‌تر است؟

(الف) Psychotic disorder NOS

(ب) Excited catatonia

(ج) Disorganized schizophrenia

(د) Undifferentiated schizophrenia

۱۴۳ - در مورد اختلال هذیانی اشتراکی کدام گزینه صحیح است؟

(الف) محتوى هذیان در اختلال هذیانی اشتراکی اغلب Hypochondriacal است.

(ب) شایع‌ترین شکل هذیان اشتراکی بین خواهر و برادر است.

(ج) عموماً هذیان در این اختلال به شدت Bizzar است.

(د) تجویز آنتی‌سایکوتیک پایه اصلی درمان و اولین قدم درمانی است.

۱۴۴ - کدام گزینه با سایرین مرتبط نیست؟

- (ب) Conjugal paranoia
- (د) expansive delusion
- (ج) olfactory reference syndrome

۱۴۵ - منظور از فرضیه Down ward drift در مورد اسکیزوفرنیا کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟

- (الف) این فرضیه نشان می‌دهد که وضع مالی پدران اسکیزوفرنی ها بدتر از گروه کنترل می‌باشد.
- (ب) این بیماران به علت بیماری به طبقه پایین اجتماعی رانده می‌شوند.
- (ج) دلالت بر افزایش اسکیزوفرنی در کشورهای جهان سوم می‌باشد.
- (د) دلالت بر پیش آگهی خوب اسکیزوفرنیا در کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد.

۱۴۶ - در مورد پیش آگهی اختلال اسکیزوفرنیفرم کدام عبارت صحیح نمی‌باشد؟

- (الف) در ۶۰-۸۰ درصد موارد سیر به طرف اسکیزوفرنیا دارد.
- (ب) در صورت عودهای دوم و سوم سیر به طرف اسکیزوفرنیای مزمن دارد.
- (ج) تعداد کمی از مبتلایان تنها یک اپیزود دارند و به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.
- (د) میزان سرگشتشگی درباره وقایع پیرامون بیمار ربطی به پیش آگهی ندارد.

۱۴۷ - در هنگام مصاحبه با بیمار پارانوئیدی، پژشک متوجه خشم بیمار می‌شود. در این شرایط کدام یک از جانب پژشک صحیح است؟

- (ب) شوخی کردن با بیمار
- (ج) افزایش رابطه دوستانه با بیمار
- (د) حفظ فاصله از بیمار

۱۴۸ - کدام یک از ویژگی‌های زیر به نفع پیش آگهی خوب برای بیمار اسکیزوفرنی است؟

- (الف) سابقهٔ فامیلی اختلال خُلقی
- (ب) وجود عالیم منفی
- (ج) شروع تدریجی
- (د) بروز در سنین جوانی

۱۴۹ - کلیه موارد ذیل جو عوامل خطر ابتلا به اختلال هذیانی نیست؟

- (الف) سن بالا
- (ب) مهاجرت اخیر
- (ج) جنس مؤنث
- (د) انزواج اجتماعی

۱۵۰ - جزو کدام دسته از اختلالات است؟ Olfactory reference syndrome

- (الف) Somatization d
- (ب) hypochondriasis
- (ج) Delusional d
- (د) Factitious d

۱۵۱ - کدام یک به عنوان دلیل مصرف بیشتر سیگار به وسیله بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا کمتر مطرح شده است؟

- (الف) کاهش پارکینسونیسم
- (ب) کاهش توهمنات
- (ج) کاهش ادرارک سروصدای محیط
- (د) کاهش عالیم منفی

۱۵۲ - کدام یک از اختلالات نوروپاتولوژیک زیر در بیماران اسکیزوفرنی نشان داده شده است؟

- (الف) کاهش گیرنده‌های D₂ در Caudate
- (ب) کاهش Pruning در سیناپس‌ها
- (ج) افزایش حجم هیپوکامپ در اتوپسی مغز بیماران
- (د) کاهش حجم آمیگدال در اتوپسی بیماران

۱۵۳- نوع Hebephrenic Schizophrenia در دسته‌بندی ICD-10 به کدام یک از انواع اسکیزوفرنی در DSM IV نزدیک‌تر است؟

(الف) Disorganized type (ب) Undifferentiated type

(ج) Catatonic (د) Residual

۱۵۴- در اختلال Schizophreniform کدام علامت زیر نشانه پیش‌آگهی بد است؟

(الف) بروز علایم بارز Psychotic طی چهار هفته اول بروز تغییرات رفتاری

(ب) عدم وجود عاطفه Flat یا Blunted

(ج) وجود سردرگمی و سرگردانی در زمان اوج حمله روانپریشی

(د) علایم Psychotic بارز دو ماه پس از مشاهده تغییرات رفتاری و عملی بروز کند.

۱۵۵- در علت شناسی اسکیزوفرنی ثوری خانواده‌های Pseudomutual توسط چه کسی ارائه شده است؟

(الف) Wynne (ب) Lidz

(ج) Jackson (د) Batesone

۱۵۶- کدام یک از توهمنات در بیمار مبتلا به اختلال هذیانی کمتر وجود دارد؟

(الف) شناوری (ب) بویایی

(ج) بینایی (د) لامسه

۱۵۷- مطالعات فامیلی نشان داده است که:

(الف) در فامیل بیماران مبتلا به اختلال هذیانی شیوع اسکیزوفرنی نسبت به جمعیت عمومی بیشتر است.

(ب) در فامیل بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی احتمال اختلال هذیانی شایع‌تر از جمعیت عمومی است.

(ج) اختلال‌های خلقی در فامیل بیماران مبتلا به اختلال هذیانی بیشتر از جمعیت عمومی است.

(د) شیوع خصیصه‌های شخصیتی سوء‌ظن و حساسیت در فامیل بیماران مبتلا دیده می‌شود.

۱۵۸- برای بیمار اسکیزوفرنی تحت درمان که همچنان Distractibility شدید دارد از کدام روش درمانی استفاده می‌کنید؟

(الف) Social Skill training (ب) Cognitive Behavioural therapy

(ج) Individual Psychotherapy (د) Group therapy

۱۵۹- کدام جمله در مورد بیماران مبتلا به بیماری Schizophreniform صحیح نیست؟

(الف) بستگان این بیماران نسبت به بستگان بیماران اسکیزوفرنی بیشتر مبتلا به اختلالات خلفی هستند.

(ب) در Brain Imaging بزرگی بطنی دیده می‌شود که با Out come بیماری مربوط نیست.

(ج) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیفورم که در ماه‌های زمستان و بهار متولد می‌شوند، هدایت پوسنی

کاهش یافته دیده می‌شود که برخلاف بیماران اسکیزوفرنی است.

(د) برای تشخیص اختلال عملکرد لازم نیست.

۱۶۰- علایم کاتاتونیک همراه با کدام اختلال بیشتر دیده می‌شود؟

(الف) افسردگی اساسی (ب) اسکیزوفرنی

(ج) اختلال نوروپریزیک (د) دوقطبی I

۱۶۱- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

(الف) در بیماران اسکیزوفرنی احتمالاً نقص سیستم نورادرنژیک موجب استعداد ابتلاء به علایم منفی می‌گردد.

(ب) تمام بیماران اسکیزوفرنی سطح HVA که متابولیت دوپامین است افزایش یافته و این افزایش نشانه ابتلاء به سایکوز است.

(ج) در مغز انسان هر نورون حاوی یک نوروتانسミتر خاص بوده و گیرنده‌های خاص برای یک نوروتانسミتر ممی‌باشد.

د) آزمایشات پس از مرگ در بیماران اسکیزوفرنیک حاکی از افزایش تعداد رسپتورهای D₄ می‌باشند.

۱۶۲- اصطلاح Schizophrenic Reaction توسط کدام یک از افراد ذیل وضع شده است؟

- | | |
|--------------|------------|
| ب) Sullivan | الف) Meyer |
| د) Schneider | ج) Jasper |

۱۶۳- کدام یک جزء علایم درجه اول اشنایدر نمی‌باشد؟

الف) بیماران با دیدن خودکار قرمز روی میز کار، احساس می‌کنند که گروهی قصد جان وی را دارند.

ب) بیمار احساس می‌کند که سایر بیماران بخشنده هنگام حرکت روی او قدم می‌گذارند.

ح) سما، به طو، ناگهانه، اعتقاد بدا ممکن است که واحد قدرت لاتناهه شده است.

۱۶۴ - شہزادے اسکنوف نسا

- الف) در آفریقا بیشتر است.
ب) در اروپا بیشتر است.
ج) در تمام جهان بکسان است.
د) در دمای محيط دارد.

۱۶۵- در ارتساط یا Pseudoneurotic Schizophrenia کدام گزنه صحیح است؟

(الف) سیما، متلا به اسکن و فنا که علم، غم اختلالات شدید تفکر دخواز علایه اضطر ام، نیز مر باشد.

ب) سما، متلا به اختلا، شخصیت مزدی، که همان متلا به اسکن و فنا هم می باشد.

ج) بیماری که علایم Panambivalence, Panphobia, Pananxiety می‌کند و به ندرت دچار اختلاس، سایکو تیک شدید ممگد.

۴) همه گزینه‌ها صحیح هستند.

۱۶۶- مهم ترین عامل منفرد در خودکشی‌های غیر قابل شنبه سما، آن اسکیزو فی نیک کدام است؟

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| rejection ب) | Hallucinatory voices الف) |
| tic delusion د) | drug-induced akatesia ح) |

۱۶۷- خانم ۳۵ ساله‌ای است که از حدود دو ماه قبل چهار توهمنات شتوانی، هذیان گزند و آسیب و افت عملکرد شغلی و خانوادگی شده، در مصاحبه و شرح حال، علایمی از تغییرات خلقی وجود ندارد. در مورد این بیمار کدام یک از موارد زیر پیشتر مطرح می‌باشد؟

Rseudoneurotic Schizophrenia (الف)

- Bouffe delirante (ب)
 - Schizoaffective. D (ج)
 - le deteriorative D (د)

^{۱۶۸}- کدامیک از حملات زیر در مورد دو اندرمانی شخصی (Personal therapy) در سماران اسکن و فنا صحیح است؟

الف) عود سماری، دا بعد از سه سال کم می‌کند.

ب) و اند؛ مانه شخصه در دهان بیماری اسکینه و فنا مؤثر نمی باشد.

ح) فتاویٰ مان و مشائخ مان از و اند مان شخص م باشد.

د) هیچ کدام از موارد فوق